

PAUTA PARA LA REALIZACION DE BIOPSIA DE PROSTATA

BAJO SEDACION-ANALGESIA

1. Ayunas desde las 9 hrs AM del día de la INTERVENCION.
2. Tomará TAVANIC 500 mg 1 comprimido cada mañana, desde el día antes de la fecha de la biopsia y hasta el 2º día después de realizada la biopsia, incluyendo también el mismo día de la prueba (TOTAL: 4 DIAS)
3. El paciente se pondrá ENEMA CASSEN 1 ó 2 horas antes de la realización de la biopsia (lo comprará en la farmacia y se lo puede poner en la habitación del hospital)
4. Acudirá al hospital para INGRESO DE MEDIA ESTANCIA a las horas del día
5. En la planta de hospitalización, a su ingreso, se cogerá via periférica con S.F. 500 cc mantenimiento.
6. Es normal que sangre por la orina, por el semen o por las heces durante unos días tras la realización de la biopsia.
7. En caso de fiebre de más de 24 horas de duración acudirá a urgencias del Hospital.
8. Solicitará cita de nuevo en consulta para ver los resultados de la biopsia unos 15 días después de la realización de la prueba.

PSA TOTAL ACTUAL:

PSA (L/T):

TACTO RECTAL: